

子どもの定期予防接種一覧表

※○歳未満、至るまでは全て誕生日（月）の前日まで

予防接種名		接種対象者	接種回数	接種間隔等
生 ロタウイルス ※どちらかを接種	ロタリックス	出生6週0日～出生24週0日	2回 または 3回	1回目／生後2か月から初回接種を開始する。 生後14週6日まで(出生日の翌日を1日として換算)の接種を推奨 2回目／1回目の接種から27日以上の間隔
	ロタテック	出生6週0日～出生32週0日		1回目／生後2か月から初回接種を開始する。 生後14週6日まで(出生日の翌日を1日として換算)の接種を推奨 2回目／1回目の接種から27日以上の間隔 3回目／2回目の接種から27日以上の間隔
不	小児肺炎球菌	生後2か月～5歳未満	4回 ※接種開始時期によっては異なる	①生後2か月～7か月未満で接種開始(望ましい接種) 初回 27日以上の間隔をおいて、2歳(標準的には1歳未満)に至るまでに3回 ※2回目が1歳を過ぎたときは3回目を接種せず追加接種を実施 追加 3回目の接種から60日以上あけ、1歳以降(1歳～1歳3か月が望ましい)に1回 ※①で接種開始しなかった場合、②～④いずれかのスケジュール(回数)で接種 ②生後7か月～1歳未満で接種開始した場合 初回 27日以上の間隔をおいて、2歳(標準的には1歳未満)に至るまでに2回 追加 2回目の接種から60日以上あけ、1歳以降に1回 ③1歳～2歳未満で接種開始した場合 60日以上の間隔をおいて2回 ④2歳～5歳未満で接種開始した場合 1回接種
不	B型肝炎	1歳未満	3回	1回目／生後2か月から接種開始が望ましい 2回目／1回目から27日以上の間隔をおく 3回目／1回目から139日以上の間隔をおく
不	五種混合 (ジフテリア/百日せき 破傷風/ポリオ/ヒブ)	生後2か月～7歳6か月未満	4回	初回 20日以上の間隔(標準的には20～56日の間隔)をおいて3回 (生後2～7か月に至るまでに開始が望ましい) 追加 3回目の接種から6か月以上の間隔(6か月～1年半後が望ましい)をおいて1回
※五種混合を接種した場合は四種混合/ヒブは接種不要	不 四種混合 (ジフテリア/百日せき 破傷風/ポリオ)	生後2か月～7歳6か月未満	4回	初回 20日以上の間隔(標準的には20～56日の間隔) をおいて3回(生後2～12か月までが望ましい) 追加 3回目の接種から6か月以上の間隔(1年～1年半後が望ましい)をおいて1回
	不 ヒブ	生後2か月～5歳未満	4回 ※接種開始時期によっては異なる	①生後2か月～7か月未満で接種開始(望ましい接種) 初回 27日以上の間隔(標準的には27～56日の間隔)をおいて、1歳に至るまでに3回 追加 3回目の接種から7か月以上の間隔(標準的には7～13か月未満の間隔)をおいて1回 ※①で接種開始しなかった場合、②③いずれかのスケジュール(回数)で接種 ②生後7か月～1歳未満で接種開始した場合 初回 27日以上の間隔(標準的には27～56日の間隔)をおいて、1歳に至るまでに2回 追加 2回目の接種から7か月以上の間隔(標準的には7～13か月未満の間隔)をおいて1回 ③接種開始が1歳～5歳未満で接種開始した場合 1回接種
生	B C G	1歳未満	1回	生後 5 か月～ 8 か月未満が望ましい
生	麻しん 風しん	1歳～2歳未満	1回	1期 1歳の誕生日～2歳の誕生日の前日まで
		2019(平成31)4/2 ～2020(令和2)4/1 生まれ(年長児)	1回	2期 小学校就学前1年間(4月1日～3月31日まで)に1回
生	水痘	1歳～3歳未満 ※水ぼうそうにかかったことのある方は接種不要	2回	初回 1歳から1歳3か月に至るまでが望ましい 追加 初回接種終了後3か月以上の間隔(6か月～12か月が望ましい)をおいて1回
不	日本脳炎	生後6か月～7歳6か月未満	3回	1期初回 3歳～4歳に至るまでが望ましい 1週間以上の間隔(1～4週間の間隔が望ましい)をおいて2回 1期追加 4歳～5歳に至るまでが望ましい 1期初回2回目の接種から6か月以上あけて(1年後の接種が望ましい)1回
		9歳～13歳未満	1回	2期 9歳～10歳に至るまでが望ましい
		2005(平成17)4/2 ～2007(平成19)4/1生まれ	特例措置	4回接種のうち不足回数分を20歳未満の間、接種可能 接種間隔については要相談
不	二種混合 (ジフテリア/破傷風)	11歳～13歳未満	1回	11歳～12歳未満が望ましい
不 子宮頸がん ※いずれかを接種 ※同じ種類のワクチンでの接種を推奨	ガーダシル	小学校 6 年生から 高校 1 年生相当の女性	2回 または 3回	2回目／1回目から1か月以上の間隔(2か月の間隔が望ましい)をおく 3回目／2回目から3か月以上の間隔(1回目から6か月以上の間隔が望ましい)をおく
	サーバリックス	2009(平成21)4/2 ～2014(平成26)4/1 生まれの女性		2回目／1回目から1か月以上の間隔をおく 3回目／1回目から5か月以上かつ、2回目から2か月半以上の間隔(1回目から6か月以上の間隔が望ましい)をおく
	シルガード9	(中学1年生の学年での接種が望ましい)		1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合(2回) 2回目／1回目から5か月以上の間隔(標準的な接種間隔は6か月後) ※2回目の接種が1回目から5か月未満の場合は、3回目の接種が必要 1回目の接種を15歳になってから受ける場合(3回) 2回目／1回目から1か月以上の間隔(標準的な接種間隔は2か月後) 3回目／2回目から3か月以上の間隔(標準的な接種間隔は1回目から6か月後)
※1年以内に接種完了が望ましい		1997(平成9年)4/2 ～2009(平成21年)4/1 生まれの女性 ※R4.4.1～R7.3.31までに 1回以上接種を実施している者	経過措置	2回または3回接種のうち、不足回数分を令和8年3月までに接種

別の種類のワクチンを接種する場合の間隔

