

子どもの定期予防接種一覧表

※〇歳未満、至るまでは全て誕生日（月）の前日まで

予防接種名		接種対象者	接種回数	接種間隔等
生	ロタリックス	出生6週0日～出生24週0日	2回 または 3回	1回目／生後2か月から初回接種を開始する。 生後14週6日まで(出生日の翌日を1日として換算)の接種を推奨 2回目／1回目の接種から27日以上の間隔
	※どちらかを接種 ロタテック	出生6週0日～出生32週0日		1回目／生後2か月から初回接種を開始する。 生後14週6日まで(出生日の翌日を1日として換算)の接種を推奨 2回目／1回目の接種から27日以上の間隔 3回目／2回目の接種から27日以上の間隔
不	小児肺炎球菌	生後2か月～5歳未満	4回 ※接種開始時期によっては異なる	①生後2か月～7か月未満で接種開始(望ましい接種) 初回 27日以上の間隔において、2歳(標準的には1歳未満)に至るまでに3回 ※2回目が1歳を過ぎたときは3回目を接種せず追加接種を実施 追加 3回目の接種から60日以上あけ、1歳以降(1歳～1歳3か月が望ましい)に1回 ※①で接種開始しなかった場合、②～④いずれかのスケジュール(回数)で接種 ②生後7か月～1歳未満で接種開始した場合 初回 27日以上の間隔において、2歳(標準的には1歳未満)に至るまでに2回 追加 2回目の接種から60日以上あけ、1歳以降に1回 ③1歳～2歳未満で接種開始した場合 60日以上の間隔において2回 ④2歳～5歳未満で接種開始した場合 1回接種
不	B型肝炎	1歳未満	3回	1回目／生後2か月から接種開始が望ましい 2回目／1回目から27日以上の間隔をおく 3回目／1回目から139日以上の間隔をおく
不	五種混合 (ジフテリア/百日せき 破傷風/ポリオ/ヒブ)	生後2か月～7歳6か月未満	4回	初回 20日以上の間隔(標準的には20～56日の間隔)において3回 (生後2～7か月に至るまでに開始が望ましい) 追加 3回目の接種から6か月以上の間隔(6か月～1年半後が望ましい)において1回
生	BCG	1歳未満	1回	生後5か月～8か月未満が望ましい
生	麻しん 風しん	1歳～2歳未満	1回	1期 1歳の誕生日～2歳の誕生日の前日まで
		2020(令和2)4/2 ～2021(令和3)4/1 生まれ(年長児)	1回	2期 小学校就学前1年間(4月1日～3月31日まで)に1回
生	水痘	1歳～3歳未満 ※水ぼうそうにかかったことのある方は接種不要	2回	初回 1歳から1歳3か月に至るまでが望ましい 追加 初回接種終了後3か月以上の間隔(6か月～12か月が望ましい)において1回
不	日本脳炎	生後6か月～7歳6か月未満	3回	1期初回 3歳～4歳に至るまでが望ましい 1週間以上の間隔(1～4週間の間隔が望ましい)において2回 1期追加 4歳～5歳に至るまでが望ましい 1期初回2回目の接種から6か月以上あけて(1年後の接種が望ましい)1回
		9歳～13歳未満	1回	2期 9歳～10歳に至るまでが望ましい
		2006(平成18)4/2 ～2007(平成19)4/1生まれ	特例措置	4回接種のうち不足回数分を20歳未満の間、接種可能 接種間隔については要相談
不	二種混合 (ジフテリア/破傷風)	11歳～13歳未満	1回	11歳～12歳未満が望ましい
不	子宮頸がん	小学校6年生から 高校1年生相当の女性 2010(平成22)4/2 ～2015(平成27)4/1 生まれの女性 (中学1年生の学年での 接種が望ましい)	2回 または 3回	1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合(2回)* 2回目／1回目から5か月以上の間隔(標準的な接種間隔は6か月後) ※2回目の接種が1回目から5か月未満の場合は、3回目の接種が必要 1回目の接種を15歳になってから受ける場合(3回)* 2回目／1回目から1か月以上の間隔(標準的な接種間隔は2か月後) 3回目／2回目から3か月以上の間隔(標準的な接種間隔は1回目から6か月後) *いずれの場合も1年以内に接種完了が望ましい

別の種類のワクチンを接種する場合の間隔

注射生ワクチン

BCG/水痘/麻しん/風しん
麻しん風しん混合
おたふくかぜ

27日以上

注射生ワクチン

制限なし

経口生ワクチン
不活化ワクチン

経口生ワクチン

ロタウイルス

不活化ワクチン

B型肝炎/小児肺炎球菌
二種混合/五種混合
日本脳炎/HPV/インフルエンザ

制限なし

注射生ワクチン

経口生ワクチン

不活化ワクチン